

复方单硝酸异山梨酯 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/312/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A4\\_8D\\_E6\\_96\\_B9\\_E5\\_8D\\_95\\_E7\\_c22\\_312159.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E5_A4_8D_E6_96_B9_E5_8D_95_E7_c22_312159.htm) 药品名称复方单硝酸异山梨酯 英文名称Compound Isosorbide Momonitratc 类别防治心绞痛药制剂缓释片。本品为类白色薄膜衣片，去膜片芯显白色。分子式成分每片含单硝酸异山梨酯60mg，阿司匹林75mg。药理毒理单硝酸异山梨酯主要作用是松弛血管平滑肌，导致外周动脉和静脉舒张，降低静脉血液回流和心脏负荷，促进心肌供氧需氧平衡。阿司匹林在体内具有抗血栓的特性，能明显减少四周动脉内阻塞性血栓的形成。药动学单硝酸异山梨酯口服后吸收缓慢，可持续17小时左右，不经过一级代谢，个体差异不大，主要通过肾脏排泄。阿司匹林口服易吸收，服后2小时血浆浓度达高峰，在肝脏代谢，主要以代谢物形式自尿排出。适应症预防冠状动脉硬化或冠状动脉痉挛所致心绞痛。不良反应皮肤潮红（血管舒张的表现）等副作用一般比较稍微。偶见过敏反应、乏力、恶心、呕吐等，一般停药后上述症状即可自行消失。相互作用酒精可协同单硝酸异山梨酯加重低血压，而低血压可导致生命危险，故服用本品的同时严禁饮酒。用法用量天天一片，早餐后吞服。注重事项本药有时可加重肥大性心肌病所致心绞痛，如早期心肌梗塞病人应用本品需严密检查和有临床监护手段。在利尿剂、某些抗高血压药物治疗中出现血容量低者或血压低者慎用。因阿司匹林对胃有刺激性，故胃及十二指肠溃疡病人慎用。妊娠期应尽量避免使用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)