

氨苯蝶啶 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/312/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B0\\_A8\\_E8\\_8B\\_AF\\_E8\\_9D\\_B6\\_E5\\_c22\\_312170.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E6_B0_A8_E8_8B_AF_E8_9D_B6_E5_c22_312170.htm) 药品名称氨苯蝶啶  
英文名称Triamterene 类别低效利尿药性状黄色结晶性粉末；  
无臭或几乎无臭，无味。在水、乙醇、氯仿或乙醚中不溶，  
在冰醋酸中极微溶解，在稀无机酸中几乎不溶。制剂片剂：  
每片50mg（黄色）。氨苯蝶啶-氢氯噻嗪片（DIAZIDE）：每  
片含氨苯蝶啶50mg；氢氯噻嗪25mg。1次1片，1日1~4次。分  
子式成分药理及应用作用部位与螺内酯相同，抑制远曲小管  
和集合管皮质段对Na的重吸收，增加Na、Cl排泄而利尿，  
对K则有潴留作用，其留钾排钠作用与螺内酯相似，但本品  
不是醛固酮拮抗剂。用药后一般不必补充钾盐。与其他利尿  
剂如噻嗪类或螺内酯合用时，能显著增强各自的利尿作用和  
减轻不良反应。本品利尿作用较弱，但尚迅速，服后1小时即  
产生利尿作用，4~6小时作用达高峰，药效可持续12~16小  
时。本品在肝脏内代谢，原形和代谢物主要由肾脏排泄，代  
谢物有无活性不详。临床上用于治疗心力衰竭、肝硬化和慢  
性肾炎等引起的顽固性水肿或腹水，亦用于对氢氯噻嗪或螺  
内酯无效的病例。贮存密闭保存。用法用量口服：1日3次，1  
次50~100mg，饭后服。隔日或连续应用。与氢氯噻嗪合用疗  
效更显著，两者均应减量。7天为一疗程。注重事项（1）服  
后偶出现恶心、呕吐、嗜睡、轻度腹泻、软弱、口干及皮疹  
等。（2）大剂量长期使用或与螺内酯合用，可出现血钾过  
高现象，停药后症状可逐渐消失。（3）眼药后多数患者出  
现淡蓝色荧光尿。（4）孕妇及育龄的已婚妇女慎用，应随  
时注重血象变化、肝功能或其他特异反应。（5）严重肝、

肾功能不全者，有高钾血症倾向者忌用。（6）应随时调整剂量。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)