

地诺前列酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E5_9C_B0_E8_AF_BA_E5_89_8D_E5_c22_312175.htm 药品名称地诺前列酮 英文名称Dinoprostone 类别子宫收缩药及引产药性状PGE₂为无色结晶，熔点60~68℃。制剂注射液：为前列腺素E₂的无水乙醇灭菌溶液，每支2mg。另附每支1mg碳酸钠的溶液及10ml的生理盐水。分子式成分药理及应用对各期妊娠子宫都有收缩作用，以妊娠晚期子宫最为敏感。给予足月或接近足月妊娠的孕妇静滴所引起的子宫收缩，类似正常分娩时所见。静滴应用尚能使早期或中期妊娠子宫产生足以导致流产的高频率和大幅度收缩。阴道内、宫腔内或羊膜腔内给药，也均能兴奋早、中期妊娠子宫并导致流产，可用于中期妊娠引产、足月妊娠引产和治疗性流产，对妊娠毒血症（先兆子痫、高血压）、妊娠合并心肾疾患者、过期妊娠、死胎不下、水泡状胎块、羊膜早破、高龄初产妇等均可应用。贮存置冰箱内保存。用法用量应用前，将前列腺素E₂和碳酸钠溶液各1支加入10ml生理盐水中，摇匀使成稀释液，供宫腔给药或静脉滴注给药。静滴：将上述含2mg前列腺素E₂的稀释液加入5%葡萄糖液500ml中滴注，一般滴速：中期妊娠引产4~8μg/分（15~30滴/分左右）；足月妊娠引产1μg/分。宫腔内羊膜腔外给药：每次给药200μg，2小时给药1次。给药3小时后，亦可酌情加用适量缩宫素，以加速产程进展。注意事项（1）必须严密观察宫缩情况，随时调节用药剂量，以防止宫缩过强而发生子宫破裂。（2）静滴时，少数可出现类似静脉炎症状，停药后常自行消失。（3）少数病例出现呕吐或轻度腹泻等。（4）既往有癫痫病史者应慎用。 100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com