

奥西那林 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E5_A5_A5_E8_A5_BF_E9_82_A3_E6_c22_312179.htm 药品名称奥西那林药物别名间羟异丙肾上腺素，异丙喘宁，羟喘 英文名

称Orciprenaline 类别 肾上腺素受体激动剂性状常用其硫酸盐，为白色结晶性粉末，无臭，味苦。熔点205 。易溶于水、乙醇，极微溶于氯仿、乙醚。制剂片剂：每片10mg，20mg。气雾剂：每瓶含本品225mg，每喷一次约含本品0.65mg。分子式成分药理及应用为选择性 β_2 受体激动剂，但对 β_2 受体的选择性作用不及沙丁胺醇。吸入给药时，其支气管扩张作用与异丙肾上腺素相似，但对心脏的兴奋作用较弱。亦因其不被儿茶酚氧位甲基转移酶代谢灭活，故作用持续时间较异丙肾上腺素长。口服时其平喘作用与麻黄碱相似。无论吸入或口服本品均可明显改善肺功能，使每秒肺活量（FEV₁）和最大呼气流速（FEF）增加15%。口服后30分钟起效，2~2.5小时达最大作用，持续4~5小时。气雾吸入2~10分钟起效，0.5~1.5小时作用达高峰，持续1~5小时。用于支气管哮喘和哮喘型支气管炎、慢性支气管炎肺气肿所致的支气管痉挛。用法用量口服，成人，每次10~20mg，1日3或4次；儿童，每日7.5~30mg。气雾吸入，每次0.65~1.95mg（喷吸1~3次），1日4~6次，每日最大量7.8mg（喷吸12次）。注重事项（1）过量可致心悸、心动过速、高血压、震颤、头痛、恶心等，亦可能引起排尿困难。（2）冠心病、心功能不全、高血压病、甲状腺机能亢进和糖尿病患者慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com