

马来酸甲麦角新碱 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E9_A9_AC_E6_9D_A5_E9_85_B8_E7_c22_312182.htm 药品名称马来酸甲麦角新碱 英文名称Methylergometrine Maleate 类别子宫收缩药及引产药制剂片剂：0.2mg。注射液：1ml:0.2mg。药动学口服或肌注后吸收快而完全，口服后6min~15min起效，肌注后2min~5min起效，持续约3h。静注几乎立即起效，持续约45min。T_{1/2}为0.5h~h，经肝脏代谢失效，仅少量（低于5%）经肾随尿排出。适应症产后或流产后子宫收缩无力或恢复不佳引起的子宫出血。用法用量口服，0.2mg~0.4mg/次，2次~4次/日，直到纠正宫缩无力和流血停止，48h为一疗程。肌内或静脉注射，0.2mg/次，必要时每2h~4h注射1次，最多注射5次。静注时需稀释后缓慢注入（至少1min）。注意事项哺乳期妇女应用时应权衡利弊，胎儿及胎盘未娩出前禁用。有冠心病、妊娠中毒症及高血压病患者禁用。用药期间不得吸烟，因烟碱（尼古丁）可使本品的血管收缩加剧。遇有低钙血症，本品的效应减弱，应谨慎静注钙盐。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com