

乳酸依沙吡啶粉针剂 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E4_B9_B3_E9_85_B8_E4_BE_9D_E6_c22_312187.htm 药品名称乳酸依沙吡啶粉针剂

药物别名利凡诺，雷佛奴尔 Rivanol 英文名

称Ethacridine Lactate 类别子宫收缩药及引产药制剂粉针剂

：100mg 药理毒理本品能刺激子宫肌肉收缩，用于中期妊娠引产。此外，本品也常用于外用杀菌。适应症终止12周～26周妊娠。不良反应可有孕妇发烧、出血及软产道损伤等，极个别孕妇有过敏反应。中毒时表现为少尿、无尿及黄疸、肝肾功能严重损害。用法用量临用前以注射用水10ml溶解（不可用生理盐水）。羊膜腔内注药，膀胱排空后，孕妇取仰卧位，选择宫体最突出部位且羊水波动明显处为穿刺点，用纱布持7号腰穿针垂直刺入腹壁，进入羊膜腔时有落空感，再继续进针0.5cm～1cm后拔出针芯，有羊水涌出后，将装有100mg本品溶液的注射器接在穿刺针上，再回抽羊水证实无误后将药液缓缓注入，拔针前须回抽羊水；拔针前将针芯插入针内快速拔针后，敷盖消毒纱布，轻压针眼。宫腔内羊膜腔外注药，孕妇排空膀胱后取膀胱截石位，常规外阴、阴道、宫颈消毒后，用宫颈钳夹住宫颈前唇，将橡皮导管沿宫颈向宫腔送入，将配制好的含100mg本品的溶液100ml注入导管；导管下端双折用线扎紧，卷折在阴道内，塞纱布1块固定，术后24h取出纱布和导管。本品的安全剂量为100mg～200mg，中毒剂量为500mg。注重事项妊娠小于16周者，常用宫腔内注药，将导管经阴道放入宫腔内羊膜腔外，经导管将药物注入，这种途径副反应较大，感染发生率也较高，而羊膜腔内注

药副反应轻，但必须在妊娠16周以后，经腹壁能注入羊膜腔内者才能使用此种给药途径。用本品引产时慎用其他引产药（如催产素静脉滴注），有肝肾功能不全者禁用本品。如出现体温39℃以上，白细胞计数超过 20×10^9 万/L时，应给予抗生素。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com