

尿崩停 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E5_B0_BF_E5_B4_A9_E5_81_9C_c22_312202.htm 药品名称尿崩停药物别名垂体后叶粉鼻吸入剂 英文名称Insufflation Posterior Pituitary 类别治疗尿崩症用药制剂粉剂：每瓶1g（附小匙）。药理及应用系用猪脑垂体后叶经提取、精制、干燥而成，有抗利尿作用，其主要成分为抗利尿素（即加压素）。适用于治疗尿崩症。贮存密闭避光，在凉处保存。用法用量用特制小匙（每匙装量约为30~40mg）取出本品一小匙（或按病情酌量增减），倒在纸上，卷成纸卷，用左手压住左鼻孔，用右手将纸卷插在右鼻孔内，抬头轻轻将药粉吸进鼻腔内，经过15~30分钟后即可见效。其作用时间为6~8小时，作用消失后再继续吸入。注重事项（1）吸入时应注重避免喷嚏，以保证疗效。（2）吸入不应过猛，否则易引起喷嚏、鼻痒、流涕及咳嗽等症状。（3）吸入过深，可引起咽喉发紧、气短、气闷、胸痛等，吸入过多，可致腹胀痛。（4）呼吸道和副鼻窦疾患、哮喘患者禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com