

缩宫素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E7_BC_A9_E5_AE_AB_E7_B4_A0_c22_312207.htm 药品名称缩宫素药物别名催产素，PITOCIN 英文名称Oxytocin 类别子宫收缩药及引产药性状白色无定形粉末或结晶性粉末，能溶于水。其水溶液显酸性。制剂注射液：每支2.5单位（0.5ml）；5单位（1ml）；10单位（1ml）。药理及应用作用见垂体后叶素。临床上主要用于引产、产前子宫收缩无力、产后出血和子宫复旧不全。贮存避光，密闭，20℃以下保存。用法用量（1）引产或催产，静脉滴注，1次2.5～5单位，加入5%葡萄糖液500ml内作缓慢静滴（10～30滴/分钟，开始时更须慢滴），根据宫缩和胎儿情况随时调节。如滴注太快，可使子宫收缩强直，而致胎死宫内、胎盘早期剥离或子宫破裂。（2）防治产后出血：每次肌注5～10单位或5～10单位加于5%葡萄糖液中静滴。（3）子宫出血，肌肉注射，1次5～10单位。肌肉注射极量，1次20单位。注重事项（1）心脏病、有剖腹产史、子宫肌瘤剔除术史及臀位产者慎用。三胎以上的经产妇（易发生子宫破裂）禁用。（2）横位、骨盆过窄、产道受阻、明显头盆不称产者禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com