

盐酸克仑特罗 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E5_85_8B_E4_c22_312211.htm 药品名称盐酸克仑特罗
药物别名盐酸双氯醇胺，氨哮素，克喘素 英文名
称Clenbuterol Hydrochloride 类别 肾上腺素受体激动剂制剂
片剂：20 μg 、40 μg ；栓剂为脂肪性基质制成的白色或乳白色栓剂。：60 μg ；膜剂：60 μg 、120 μg ；气雾剂：10 μg /喷,200喷。 药理毒理为选择性 β_2 受体激动剂，其松弛支气管平滑肌作用强而持久。有增强纤毛运动，溶解粘液的作用。但对心血管系统影响较少。 药动学片剂：口服10~20min起效， T_{max} 约2~3h，维持时间6~8h；气雾剂：气雾吸入5~10min起效，维持时间2~4h；栓剂：直肠给药后10~30min起效，作用可持续8~24h。 适应症支气管哮喘、慢性喘息型支气管炎、肺气肿等呼吸系统疾病所致的支气管痉挛。 不良反应可有轻度心悸、手颤、头晕等。一般于用药过程中自行消失。 用法用量口服或舌下含服：20 μg ~40 μg /次，3次/日。 气雾吸入：10 μg ~20 μg /次，3~4次/日。 直肠给药：60 μg /次，2次/日，也可于睡前给药1次。 注重事项甲亢、心动过速或高血压病患者慎用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com