

麦角新碱 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E9_BA_A6_E8_A7_92_E6_96_B0_E7_c22_312212.htm 药品名称麦角新碱 英文名称ergometrine 类别子宫收缩药及引产药性状常用其马来酸盐，为白色或类白色结晶性粉末；无臭；微有引湿性；遇光易变质。在水中略溶，在乙醇中微溶，在氯仿或乙醚中不溶。制剂注射液：每支0.2mg（1ml）；0.5mg（1ml）。片剂：每片0.2mg；0.5mg。分子式成分药理及应用本品直接作用于子宫平滑肌，作用强而持久。其作用强弱与子宫生理状态和用药剂量有关。妊娠子宫对麦角新碱比未孕子宫敏感，在临产或产后子宫更为敏感；稍大剂量可引起子宫强直性收缩，对子宫体和颈都有兴奋作用。大剂量时可使子宫肌强直性收缩，机械压迫肌纤维中的血管，而达阻止出血。临床用于治疗产后子宫出血、子宫复旧不良、月经过多等。贮存避光，在冷处保存。用法用量静注或肌注：1次0.2～0.5mg。静注时可用25%葡萄糖注射液20ml稀释。极量1次0.5mg，1日1mg。子宫壁注射，剖腹产时直接注射于子宫肌层0.2mg；产后或流产后为了止血可在子宫颈注射0.2mg，注射子宫颈左右两侧。口服，1次0.2～0.5mg，1日1～2次。注重事项（1）部分病人用药后可发生恶心、呕吐、出冷汗、面色苍白等反应，不宜以静注作为常规使用，一次剂量不应超过0.5mg。（2）有妊娠中毒症、高血压综合征、高血压病及冠心病患者禁用。（3）胎儿及胎盘未娩出前禁用，以免发生子宫破裂及胎儿宫内窒息死亡。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com