

芫花萜 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E8_8A_AB_E8_8A_B1_E8_90_9C_c22_312214.htm 药品名称芫花萜 英文名称Yuanhuacin 类别子宫收缩药及引产药性状白色或类白色结晶，无臭，有刺激性。易溶于氯仿、醋酸乙酯，微溶于乙醇，不溶于水。制剂注射液：每支80 μg（2ml）；膜剂：每张50 μg；80 μg。药理及应用本品为国内创制的中期妊娠引产药，可能由于使蜕膜细胞变性坏死，释放出大量内源性前列腺素，从而引起宫缩。用于中期妊娠引产。据报道，本品一次引产成功率为97.1%，平均引产时间约76小时。贮存避光保存。用法用量羊膜腔或宫腔注射：1次70~80 μg。注重事项（1）部分引产者可出现发抖和发热，发生率约11%。治疗措施：注重保暖，轻者可给予异丙嗪，重者可肌注地塞米松。（2）其他副作用有头痛、头晕、恶心、心悸、发热等，一般自行缓解。（3）下述情况禁用本品：重要脏器有明显疾病者，如急慢性肝、肾疾病，心脏病；出血倾向者；子宫上有疤痕如有剖腹产史；子宫颈发育差；哺乳期；生殖过急性炎症及重度慢性宫颈炎者。（4）胎儿娩出后，给予催产素，以防产后出血 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com