

地诺前列素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E5_9C_B0_E8_AF_BA_E5_89_8D_E5_c22_312219.htm 药品名称地诺前列素 药物别名前列腺素F2 PGF2 英文名称Dinoprost 类别子宫收缩药及引产药制剂注射液：4ml:20mg、8ml:40mg。药动学羊膜腔内给药后吸收，缓慢进入体循环，出现流产平均需时20h~24h，在羊水中T_{1/2}为3h~6h，静脉注射时T_{1/2}短于1min。在肺与肝内降解，代谢物主要从肾脏排泄。适应症妊娠中期人工流产（16周~20周）及过期流产、胎死宫内或较明显的胎儿先天性畸形的引产，也可用于足月妊娠时引产和用于动脉造影。用法用量羊膜腔内给药，40mg/次。羊膜腔外宫腔内用药（如在妊娠13周~15周时羊膜腔内注射困难），750(g/次,1次/2h~3h。静脉滴注，用于足月妊娠引产时以5%葡萄糖注射液配成50(g/ml的溶液，滴速2.5(g/min，总量1mg~4mg。注重事项羊水抽出后如为血性，切勿用药。如本品引产无效，要等待宫缩停止后才可改用其他方法引产。妊娠X类。用前列腺素阴道栓终止妊娠失败后，必须改用其他方法终止妊娠。妊娠晚期有头盆不称、胎位异常者禁用，胎膜已破时也禁用。有贫血史、哮喘史、活动性肺病、癫痫病史、活动性心脏病、心血管病史、高血压史、宫颈硬化、子宫纤维瘤、子宫手术史、宫颈炎或阴道炎、糖尿病史、青光眼、肝病及肾病史患者应慎用。使用前药栓应放置在室温中，且避免用手直接接触无包装的栓剂。病人放置栓剂后应保持卧位10min。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com