

烟酸片 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E7_83_9F_E9_85_B8_E7_89_87_c22_312221.htm 药品名称烟酸片 药物别名 尼古丁酸，尼克酸，维生素PP Nicotene，Niacin 英文名称 Niacin Nicotinic Acid 类别调节血脂药及抗动脉粥样硬化药 制剂片剂：50mg、100mg 分子式成分化学名：吡啶-3-羧酸。

药理毒理本品有较强的扩张四周血管作用。本品为维生素类药物。烟酸在组织呼吸过程中，作为催化重要的氧化还原反应的多种酶中的辅酶发挥作用。它可以成为基质脱下来的氧离子的受体被还原，然后经黄素蛋白的作用被再氧化，恢复到原来的状态。烟酸具有扩张血管、降低血脂、减少胆固醇合成，溶解纤维蛋白，防止血栓形成的作用。药动学口服后T_{max}约0.5~1h，T_{1/2}约45min。口服易吸收，广泛分布于体内，过量部分迅速以代谢产物及原形物由尿排出。可分泌入母乳。适应症高脂蛋白血症，亦用于四周循环障碍等烟酸缺乏病等。

- 1.用于维生素PP缺乏症的预防和治疗。
- 2.扩张小血管。烟酸可缓解血管痉挛症状，改善局部供血。
- 3.缺血性心脏病。采用烟酸治疗心肌梗死和心绞痛，多数病人的心绞痛症状得到缓解。
- 4.降血脂。应用大剂量烟酸可降低血脂。

不良反应有皮肤潮红及恶心、呕吐、腹泻、消化不良等胃肠道反应，亦有高尿酸血症、痛风、黑色棘皮病和糖耐量降低等。相互作用可使降压药及吩噻嗪衍生物的作用加剧，并能使纤维蛋白酶失活。与肾上腺阻滞剂合用可引起体位性低血压。用法用量口服：50mg~200mg/次，3~4次/日，餐后服。用于降血脂：每日3g~6g，4次/日，4~7日后可增加1g~2g/次，3次/日。注重事项妊娠C类，青光眼、孕妇、哺乳期妇女

慎用。糖尿病、痛风、溃疡病、肝功能异常者禁用。 100Test
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com