

硝酸异山梨酯 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E7_A1_9D_E9_85_B8_E5_BC_82_E5_c22_312228.htm 药品名称硝酸异山梨酯
药物别名硝异梨醇，硝酸脱水山梨醇酯，异舒吉，消心痛，Sorbide Nitrate，ISOKET，SORBITRATE，CARVASIN，NITOROL 英文名称Isosorbide Dinitrate 类别防治心绞痛药性
状白色结晶性粉末；无臭。熔点68~72。在丙酮或氯仿中易溶，在乙醇中略溶，在水中微溶。制剂片剂：每片2.5mg；5mg；10mg。乳膏：1.5g（10g）。缓释片：每片5mg。注射液：10mg（10ml）。喷雾剂：250mg / 200次。分子式成分药理及应用作用与硝酸甘油相似，但较持久（能维持4小时以上），口服后半小时见效，含服2~3分钟见效。因此舌下含服用于急性心绞痛发作，口服用于预防发作。常与普萘洛尔合用。因不易在空气中变性，故便于保管和携带。用法用量缓解心绞痛，舌下给药，1次5mg。预防心绞痛，口服：1日2~3次，1次5~10mg，1日10~30mg。外用乳膏，1次0.6g，均匀涂布在心前区约5cm×5cm，1日1次。缓释片，每日2次，每次1片。静脉滴注，2mg / 小时。喷雾吸入，每次1.25~3.75mg。注重事项（1）可有头痛反应，应由小剂量开始，以后逐渐增量，此外尚可见面部潮红、灼热感、恶心、眩晕、出汗甚至虚脱等反应。（2）偶发生皮疹，甚至利脱性皮炎。酒精常可增加其副作用。（3）青光眼禁用。（4）长期应用可发生耐受性；和其他硝酸酯有交叉耐药性。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com