

曲美他嗪 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E6_9B_B2_E7_BE_8E_E4_BB_96_E5_c22_312240.htm 药品名称曲美他嗪药物别名冠脉舒，心康宁，三甲氧苄嗪，VASTAREL

，IDAPTAN，VASTAZIN 英文名称Trimetazidine 类别防治心绞痛药性状白色结晶或结晶性粉末，味苦，熔点235～238

，极易溶于水，稍难溶于乙醇，几不溶于乙醚、苯、丙酮。

制剂片剂：每片2mg；3mg。注射液：4mg（2ml）。分子式成分药理及应用为作用较强的抗心绞痛药，其起效较硝酸甘油慢，但作用持续时间较长。具有对抗肾上腺素、去甲肾上腺素及加压素的作用，能降低血管阻力，增加冠脉血流量及四周循环血流量，促进心肌代谢及心肌能量的产生。同时能减低心脏工作负荷。降低心肌耗氧量及心肌能量的消耗，从而改善心肌氧的供需平衡。尚能增加对强心甙的耐受性。临床适用于冠脉功能不全、心绞痛、陈旧性心肌梗死等。对伴有严重心功能不全者可与洋地黄并用。用法用量口服：每次2～6mg，1日3次，饭后服；总剂量每日不超过18mg。常用维持量为每次1mg，1日3次。静脉注射：8～20mg/次，加于25%葡萄糖注射液20ml中。静脉滴注：8～20mg，加于5%葡萄糖液500ml中。注重事项（1）个别可有头晕、食欲不振、皮疹等。（2）新近心肌梗死患者忌用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com