

双嘧达莫 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E5_8F_8C_E5_98_A7_E8_BE_BE_E8_c22_312244.htm 药品名称双嘧达莫药物别名潘生丁，双嘧哌胺醇，哌醇定，PERSANTIN 英文名称Dipyridamole 类别防治心绞痛药性状黄色结晶性粉末；无臭；味微苦。在氯仿中易溶，在乙醇中溶解，在丙酮中微溶，在水中几乎不溶；在稀酸中易溶。制剂片剂：每片25mg。注射液：每支10mg（2ml）。分子式成分药理及应用对冠状血管有较强的扩张作用，可显著增加冠脉流量，增加心肌供氧量。临床上用于冠心病，但对疗效评价不一。有人认为，因本品主要扩张冠脉的小阻力血管，而在心肌缺血区小阻力血管已代偿性地扩张以维持其最大的血液供给，因此应用本品不仅不能扩张缺血区的血管，改善其供血情况，反而会使缺血区的血液流向非缺血区，对心肌梗死患者不利。对心绞痛患者短期亦难见效，只有在长期使用后，可能由于促进侧枝循环形成而逐渐发挥疗效。能抑制血小板聚集，防止血栓形成，故用于冠心病对防止其发展有一定的意义。用法用量口服：1日3次，每次25～100mg，饭前1小时服。在症状改善后，可改为每日50～100mg，2次分服。深部肌注或静注：每次10～20mg，1日1～3次。静脉滴注，1日30mg。注重事项（1）可有头痛、眩晕、恶心、呕吐、腹泻等。（2）不宜与葡萄糖以外的其他药物混合注射。（3）与肝素合用可引起出血倾向。（4）有出血倾向患者慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com