

垂体后叶素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E5_9E_82_E4_BD_93_E5_90_8E_E5_c22_312245.htm 药品名称垂体后叶素
英文名称p Pituitrin 类别子宫收缩药及引产药性状本品为近白色粉末，略有臭。能溶于水。制剂注射液：每支5单位（1ml）；10单位（1ml）。药理及应用本品所含催产素，小剂量可增强子宫的节律性收缩，大剂量能引起强直性收缩，使子宫肌层内血管受压迫而起止血作用。作用较麦角快而维持时间短（约半小时），故常与麦角合用（其作用可持续一小时以上）。所含加压素有抗利尿和升压作用。本品可用于产后出血、产后复旧不全、促进宫缩、引产、肺出血、食管及胃底静脉曲张破裂出血和尿崩症等，由于有升高血压作用，现产科已少用。因能被消化液破坏，不宜口服。贮存冷藏 避免冰冻。用法用量（1）一般应用肌注，每次5~10单位。（2）肺出血可静注或静滴，静滴加生理盐水或5%葡萄糖500ml稀释后慢滴，静注加5%葡萄糖20ml稀释慢注。极量为每次20单位。大量肺咯血，静注10单位。（3）对产后出血 必须在胎儿和胎盘均已娩出后再肌注10单位，如作预防性应用，可在胎儿前肩娩出后立即静注10单位。（4）对临产阵缩弛缓不正常者：偶亦用于催生，但须慎用，以5%葡萄糖液500ml稀释后缓慢滴注，并严密观察。注重事项（1）用药后，如出现面色苍白、出汗、心悸、胸闷、腹痛、过敏性休克等，应立即停药。（2）高血压、冠状动脉疾病、心力衰竭、肺原性心脏病患者忌用。（3）凡胎位不正、骨盆过狭、产道阻碍等均忌用本品引产。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com