

葛根素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E8_91_9B_E6_A0_B9_E7_B4_A0_c22_312255.htm 药品名称葛根素 药物别名麦普宁、天保康 Tapocon 英文名称Puerarin 类别四周血管扩张药 制剂本药为无色或淡黄色的澄明液体。注射剂

：100mg/2mL。分子式成分葛根素的化学名为4,7-二羟基8-b-D葡萄糖异黄酮。药理毒理葛根素为血管扩张药，对冠状动脉和脑血管有扩张作用。可降低心肌耗氧量，并有活血化瘀、改善微循环的作用。适应症用于冠心病，急性心绞痛，心肌梗塞，视网膜动，静脉阻塞，突发性耳聋等症状的治疗。不良反应个别病例开始时有暂时性消化道反应如腹胀、恶心，继续用药可自行消失。个别病例连续用药10天后，偶有原因不明的发热现象（男性为主），建议采用以1周为一疗程的间歇给药疗法。用法用量使用前用5%葡萄糖注射液或氯化钠注射液溶解，稀释：静脉注射，一次100-200mg，一日两次；静脉滴注，一次200-400mg，一日一次；15天为一疗程。用药须知：本药遇碱变黄，勿在稀释时加入碱性药物。注意事项1．有出血倾向者慎用。2．血容量不足者应在短期内补足血容量后使用本品。严重肝、肾功能不全，心力衰竭及其它严重器质性、疾病患者禁用。对本品过敏者禁用。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com