

丙卡特罗 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E4_B8_99_E5_8D_A1_E7_89_B9_E7_c22_312258.htm 药品名称丙卡特罗药物别名普鲁卡地鲁，美喘清 英文名称Procaterol 类别 肾上腺素受体激动剂性状常用其盐酸盐，为白色结晶性粉末。制剂片剂：每片25 μ g；50 μ g。分子式成分药理及应用为选择性 β_2 受体激动剂，对支气管的 β_2 受体具有较高选择性，其支气管扩张作用强而持久。尚具有较强抗过敏作用，不仅可抑制速发型的气道阻力增加，而且可抑制迟发型的气道反应性增高。本品尚可促进呼吸道纤毛运动。人口服本品100 μ g后，衰减模式呈二相性，第一相的 $t_{1/2}$ 为3.0小时，第二相的 $t_{1/2}$ 为8.4小时。用于防治支气管哮喘、喘息性支气管炎和慢性阻塞性肺部疾病所致的喘息症状。用法用量口服，成人，每晚睡前1次服50 μ g或每次50 μ g，早晚（睡前）各服1次；儿童，6岁以上，每晚睡前1次服25 μ g或每次25 μ g早晚（睡前）各服1次；6岁以下儿童可按每次1.25 μ g / kg，1日2次服用。可视患儿年龄和症状的严重程度调整剂量。注重事项（1）偶见心悸、心律失常、面部潮红、头痛、眩晕、耳鸣、恶心或胃不适、口渴、鼻塞、倦怠和皮疹。（2）甲状腺功能亢进症、高血压病、心脏病和糖尿病患者慎用。由于本品对孕妇和婴幼儿的安全性尚未确定，故亦应慎用。（3）本品有抗过敏作用，故评估其他药皮试反应时，应考虑本品对皮试的影响。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com