

利托君〔基〕 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E5_88_A9_E6_89_98_E5_90_9B_E3_c22_312259.htm 药品名称利托君〔基〕 英文名称Ritodrine〔 〕 类别抗早产药制剂片剂：每片10mg。注射液：每支50mg（5ml）。分子式成分药理及应用为 β_2 肾上腺素受体激动剂，可激动子宫平滑肌中的 β_2 受体，抑制子宫平滑肌的收缩，减少子宫的活动而延长妊娠期。用法用量静滴：取本品150mg用500ml静滴溶液稀释为0.3mg / ml的溶液，于48小时内使用完毕，溶液变色或出现沉淀或结晶则不可再用。静滴时应保持左侧姿势，以减少低血压危险。开始时应控制滴速使剂量为0.1mg / 分，并逐渐增加至有效剂量，通常保持在0.15 ~ 0.35mg / 分之间，待宫缩停止，后，至少持续输注12小时。静滴结束前30分钟，可以开始维持治疗，一般口服本品10mg（1片）。头24小时内通常口服剂量为每2小时10mg，此后每4 ~ 6小时10 ~ 20mg，每日总剂量不超过120mg。为了抗早产的需要此种维持治疗还可按此剂量继续口服。注重事项静滴：取本品150mg用500ml静滴溶液稀释为0.3mg / ml的溶液，于48小时内使用完毕，溶液变色或出现沉淀或结晶则不可再用。静滴时应保持左侧姿势，以减少低血压危险。开始时应控制滴速使剂量为0.1mg / 分，并逐渐增加至有效剂量，通常保持在0.15 ~ 0.35mg / 分之间，待宫缩停止，后，至少持续输注12小时。静滴结束前30分钟，可以开始维持治疗，一般口服本品10mg（1片）。头24小时内通常口服剂量为每2小时10mg，此后每4 ~ 6小时10 ~ 20mg，每日总剂量不超过120mg。为了抗早产的需要此种维持治疗还可按此剂量继续口服。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载

。详细请访问 www.100test.com