

氯巴占 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E6_B0_AF_E5_B7_B4_E5_8D_A0_c22_312272.htm 药品名称氯巴占 药物别名氧异安定，Frisium 英文名称Clobazam 类别抗癫痫药 制剂片剂：每片10mg，20mg。分子式成分药理及应用本品具有抗焦虑和抗惊厥作用，抗电休克作用的ED₅₀比地西洋小而比苯巴比妥、丙戊酸钠大。治疗安全范围比地西洋、苯巴比妥、丙戊酸钠宽。口服吸收快而完全，服药1~3小时后达血药峰浓度，经肝脏代谢，代谢产物为N-去甲基氧异安定，同样有抗惊厥作用，作用强度为氯巴占的2/3。t_{1/2}为60小时，如每日用药30mg，约6天达稳态血浓度。本品适用于治疗对其它抗癫痫药无效的难治性癫痫，可单独应用，亦可作为辅助治疗用。对复杂部分性发作继发全身性发作和Lennox-Gas-laut综合征效果更佳。相互作用与卡马西平、苯巴比妥、苯妥英钠、丙戊酸合用时，本品的血浓度降低，而其它药浓度升高。合用丙戊酸钠时，N-去甲基代谢产物血浓度降低，而合用卡马西平、苯妥英钠时，N-甲基代谢产物浓度升高，因而合用时应注重调整剂量。用法用量口服：从小剂量开始，每日20~30mg（0.5~1mg/kg），逐步加量。如与其它抗癫痫药合用，则应减少本品剂量，每日应用5~15mg（0.1~0.3mg/kg）。注重事项（1）不良反应与其它苯二氮类相似，但都较轻微，偶见有轻度的镇静、焦躁、抑郁和肌无力。（2）如连续应用，其抗惊厥作用逐渐减弱，可采用放假疗法，如女性患者，在月经期发作时，可在月经来潮前2~3天开始用药，10天后停用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com