

考来烯胺 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E8_80_83_E6_9D_A5_E7_83_AF_E8_c22_312273.htm 药品名称考来烯胺药

物别名（消胆胺，降胆敏，消胆胺脂，Cholestyramine Resin，CUEMID）英文名称Colestyramine 类别调节血脂药及抗动脉粥样硬化药性状白色粉末，有刺激臭及异味。水内不溶。

药理及应用为阴离子交换树脂，口服后与肠道的胆酸结合，阻碍后者吸收入血，使血中胆酸量减少，结果促使血中胆固醇向胆酸转化，因而降低血胆固醇。用于Ⅱ型高脂血症、动脉粥样硬化以及肝硬化、胆石病引起的瘙痒。其缺点是用量大，约2%的患者产生胃肠道反应。用法用量（1）治动脉粥样硬化：1日3次，每次服粉剂4~5g。（2）止痒：开始时1日量6~10g，维持量每日3g，3次分服。注重事项（1）长期服用可使肠内结合胆盐减少，引起脂肪吸收不良，应适当补充维生素A、D、K等脂溶性维生素及钙盐。（2）本品味道难闻，可用调味剂伴服。（3）不可加大剂量，以免引起胃肠道不适，腹泻等。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com