

环扁桃酯 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E7_8E_AF_E6_89_81_E6_A1_83_E9_c22_312275.htm 药品名称环扁桃酯药物别名三甲基环己扁桃酸，抗栓丸，CYCLOSPASMOL

，CYCLOSPA，HACOSAN 英文名称Cyclandelate 类别四周血管扩张药性状白色或类白色的无定形粉末；有特臭，味苦。在乙醇或丙酮中极易溶解，在水中几乎不溶。制剂胶囊剂：每胶囊100mg。分子式成分药理及应用能直接松弛血管平滑肌使血管扩张，对脑、肾、血管及冠状动脉有选择性的持续扩张作用，从而使血流量增加。作用较罂粟碱弱而持久。据报道，本品尚能促进侧枝循环。对呼吸、心率、心排血量、心肌氧耗量、血压等几无影响。用于脑血管意外及其后遗症、脑动脉硬化症、脑外伤后遗症、肢端动脉痉挛症、手足发绀、闭塞性动脉内膜炎、内耳眩晕症等。用法用量1次服100~200mg，1日3~4次。症状改善后，可减量至1日300~400mg。对脑血管疾病一般每次服200~400mg，1日3次。注重事项（1）可引起恶心、呕吐、食欲不振、上腹部不适，有时出现面部潮红、头痛、头晕、发疹、瘙痒感、口干、心悸等症状，大剂量可引起低血压。（2）脑血管意外、急性期、孕妇及哺乳期妇女禁用；严重闭塞性冠状动脉和脑血管疾病、青光眼、出血或有出血倾向的患者慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com