

托哌酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/312/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_98\\_E5\\_93\\_8C\\_E9\\_85\\_AE\\_c22\\_312279.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E6_89_98_E5_93_8C_E9_85_AE_c22_312279.htm) 药品名称托哌酮药物别名 甲苯哌丙酮，甲哌酮，脑脉宁，N-553，MYDOCALM 英文名称 Tolperisone 类别四周血管扩张药性状白色结晶性粉末，略有异臭，味酸苦发麻。熔点176~177。易溶于水、乙醇、氯仿；难溶于丙酮，不溶于苯、乙醚。制剂片剂：每片50mg。分子式成分药理及应用具有血管扩张作用及中枢性肌肉松弛作用。它直接扩张血管平滑肌和抑制多突触反射，能降低骨骼肌张力，缓解因脑、脊髓受损而出现的肌肉强直、阵挛等。它尚能使外周血流量增加。口服吸收迅速，1~2小时血浓度达峰值。临床可用于治疗闭塞性血管病，如动脉硬化、血管内膜炎等；还适用于中风后遗症、脑性麻痹症、脊髓末梢神经疾患等。对各种脑血管疾病引起的头痛、眩晕、失眠、肢体发麻、记忆力减退、耳鸣等症状也有一定疗效。用法用量口服：每次50~100mg，1日3次。可随年龄、症状增减用量。注重事项少数患者服后有食欲不振、腹痛、头晕、嗜睡、面部潮红、患肢肿痛、下肢无力、乏力等症状，但不严重，多为一过性，一般停药1~2天即消失。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)