

非诺特罗 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E9_9D_9E_E8_AF_BA_E7_89_B9_E7_c22_312290.htm 药品名称非诺特罗药

物别名酚间羟异丙肾上腺素，酚丙喘宁，酚丙喘定 英文名称Fenoterol 类别 肾上腺素受体激动剂制剂片剂：每片2.5mg

。气雾剂：每瓶含本品200mg（300喷）。分子式成分药理及应用为间羟异丙肾上腺素的衍生物，对 β_2 受体有较强的激动作用，治疗量对心脏 β_1 受体较少影响。口服本品5mg引起的

支气管扩张作用与肺功能改善与5mg间羟叔丁肾上腺素类似，而几无心脏副作用。加大剂量虽仍可增强其支气管扩张作用，但心血管副作用和震颤的发病率亦增加。一次气雾吸入

本品200~400 μ g可产生持久的支气管扩张作用，而副作用较少，再加大吸入量并不增强疗效，反增加副作用。多数观察指出，在吸入相同剂量时，本品与沙丁胺醇疗效相同。口服

从胃肠道迅速吸收，2小时后血药浓度达峰值，作用可持续6~8小时。气雾吸入数分钟即生效，1~2小时作用达高峰，至少持续4~5小时。用于支气管哮喘，对儿童支气管哮喘有较好的疗效。用法用量口服，每次5~7.5mg，1日3次。儿童酌减。气雾吸入，成人，每次0.2~0.4mg，1日3或4次；儿童，

每次0.2mg，1日3或4次。注重事项（1）较大剂量可致心悸、手指震颤、头痛等副作用。（2）心绞痛、心律失常、心功能不全、高血压病和甲状腺功能亢进症者慎用。100Test 下载

频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com