

青阳参总甙 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/312/2021\\_2022\\_\\_E9\\_9D\\_92\\_E9\\_98\\_B3\\_E5\\_8F\\_82\\_E6\\_c22\\_312299.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E9_9D_92_E9_98_B3_E5_8F_82_E6_c22_312299.htm) 药品名称青阳参总甙  
类别抗癫痫药制剂青阳参片（健脑克癫片）：每片含青阳参总甙70mg；80mg；100mg。药理及应用动物实验证实，本品对听源性惊厥发作有对抗作用，有效作用时间可维持24小时。单用对小鼠超强电休克惊厥（MES）无对抗作用，但能加强苯巴比妥或苯妥英钠的抗小鼠MES效应，即合用时有协同作用。对成四氮引起的惊厥无效。临床试用结果表明，本品对各型癫痫均有效，对大发作疗效较好，总有效率为80%；与其它抗癫痫药合用治疗顽固性癫痫或难治性癫痫的总有效率达79%。作为抗癫痫药，本品具有以下特点：有效时间长，不需频繁给药，采用间断给药（一般1~2日1次），即可获得满足的疗效。对各种类型的癫痫均有一定疗效。无镇静及嗜睡作用。近期（6~20个月）观察，尚未发现明显不良反应。癫痫患者兼有肝功能不良时，加服本品后能恢复正常；由于癫痫发作频繁和病程迁延而兼有头痛头昏的癫痫患者，加服本品后症状可迅速减轻或完全消失。临床主要与苯妥英钠或苯巴比妥等抗癫痫药合用治疗顽固性癫痫或难治性癫痫，亦可单独用于治疗一般性癫痫。用法用量口服：剂量为15~20mg/kg，每日1次，一般连服2日停1日。儿童减半。注重事项（1）口服用药毒性低。临床常用剂量在治疗期间未发现毒性作用，但加大剂量达103mg/kg（试用于精神分裂症）时，可出现恶心、呕吐、眩晕，继而出现抽搐、昏迷。（2）对人有明显蓄积作用。因此，临床应用时宜采用间断给药法，日剂量不超过20mg/kg。100Test 下载频道开通，

各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)