

丁咯地尔缓释片 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E4_B8_81_E5_92_AF_E5_9C_B0_E5_c22_312310.htm 药品名称丁咯地尔缓释片 药物别名意鲁顿缓释片 Irrodan Retard 英文名称buflomedil 类别四周血管扩张药制剂缓释片 赋形剂有甲基丙烯酸酯共聚物399 mg；滑石11 mg；硬脂酸镁11 mg。 药理毒理本药具有选择性血管扩张作用，通过抑制毛细血管前括约肌痉挛可改善脑及上、下肢微循环。这些均与药物干扰Ca²⁺转运有关。可显著增加股动脉血流而不明显改变血流动力学指标，也不影响糖、脂肪及蛋白质之代谢。还可促进毛细血管增生及毛细血管开放，并对抗毛细血管前括约肌痉挛。除此之外，尚能对抗血管纤维细胞痉挛，改变红细胞膜的变形性，对抗血小板聚集，改善缺血组织的氧摄取。动物实验发现该药尚有一定的抗 α 肾上腺素受体及5-HT受体作用，此外还有Na⁺通道阻滞作用。 药动学缓释片的稳态血浓度可维持16 hr以上，给药后24 hr仍可保持其有效血浓度。本药进入外周组织，并通过肝脏代谢，其主要代谢途径为芳香环之去甲基化反应。主要以原型药或其代谢产物形式经肾脏排泄。适应症外周血管病如雷诺氏病及其综合征，血栓性脉管炎，间歇性跛行，脑血管供血不足症状如眩晕、耳鸣、注重力下降、人格障碍、记忆力下降、定向障碍。中风，脑外科手术后遗症。 不良反应 偶见胃肠道反应(胃疼、恶心、胃灼热感等)，头疼、眩晕、嗜睡或失眠、潮热、瘙痒。 用法用量600 mg qd。 用药过量：可产生脑刺激症状如：激动、呕吐、惊厥等。一旦发生可用安定类药物对抗。 注重事项对本药过敏者，妊娠首3个月和

哺乳期妇女禁用。本药可致眩晕、嗜睡，故需高度集中精力的工作者(如驾车)应慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com