

氢化麦角碱 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/312/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B0\\_A2\\_E5\\_8C\\_96\\_E9\\_BA\\_A6\\_E8\\_c22\\_312315.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E6_B0_A2_E5_8C_96_E9_BA_A6_E8_c22_312315.htm) 药品名称氢化麦角碱 类别四周血管扩张药制剂0.3MG/1ML药理及应用本品能增强神经节细胞的代谢活性，直接激活大脑多巴胺能和5-羟色胺能神经，并能拮抗大脑  $\alpha$ -肾上腺素能受体，中枢作用：作用于中枢神经系统的血管舒缩中枢而产生交感神经阻滞作用；外周作用：阻断  $\alpha$ -肾上腺素能受体和直接的扩血管作用，从而降低血压，中枢和外周作用的结果，使脑与外周血循环及相关的病症得到改善。适应症脑供血不足；急性缺血性脑损伤；卒中后状态或脑外伤后遗症及老年性痴呆；外周血管病（血管栓塞性脉管炎、雷诺氏病、手足发绀、动脉硬化和糖尿病引起的功能紊乱）；颈部综合征；血管性视网膜病；血管性耳蜗前庭综合征；血管性偏头痛和其他头痛；高血压。不良反应通常耐受良好，偶见消化道紊乱：恶心、呕吐、腹胀、厌食；视物模糊；鼻充血及皮疹，出现以上现象无须停药，通常减量后可避免副反应发生。用法用量口服：1片/次，3次/日，每日总剂量为3~6mg，餐前服用。注重事项静脉快速给药可能引起直立性低血压。对本药过敏者禁用；明显的心博徐缓及严重的低血压患者不可采用注射给药禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)