

氢麦角碱 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E6_B0_A2_E9_BA_A6_E8_A7_92_E7_c22_312321.htm 药品名称氢麦角碱
药物别名氢化麦角碱，氢麦毒，安得静，海特琴

，HYDERGIN 英文名称Dihydroergotoxine 类别四周血管扩张
药制剂注射液：每支0.3mg（1ml）。含片：每片0.25mg

；0.5mg。药理及应用本品为乙烷（或甲烷）磺酸双氢麦角毒
（包括Ergocristine等三种生物碱）的双氢衍生物的混合物，
属于α阻滞剂，能扩张四周血管、降低血压、减慢心率，并有
中枢镇静作用，主要与异丙嗪、哌替啶等配成冬眠合剂应用

。也可用于动脉内膜炎、肢端动脉痉挛症、血管痉挛性偏头
痛等。说明麦角生物碱中，麦角毒碱（Ergotoxine）和麦角胺
（Ergotamine）均有抗肾上腺素的作用，而麦角新碱

（Ergonovine）则无此种作用。麦角毒碱及麦角胺虽能减弱肾
上腺素对血压的作用，但因本身能直接作用于血管壁而表现
较强的血管收缩作用，故不能产生血压降低的效应。当把麦
角毒碱（包含Ergocristine，Ergo cornine，Ergocryptine等三种
生物碱）进行部分还原（氢化）时，所得的双氢混合物其抗
肾上腺素作用增强，而对子宫和血管壁的兴奋作用则大为减
弱。用法用量肌注或皮下注射，每日或隔日1次，每次0.3

~ 0.6mg；亦可舌下给药（含片），每4~6小时1次，每次0.5
~ 2mg。不宜口服。注重事项（1）严重副作用为竖立性低血
压，故病人在注射后必须卧床2小时以上。（2）禁用于低血
压症、严重的动脉硬化、心脏器质性损害、肾功能障碍患者
及老人。（3）本品也可用于静滴，但应缓慢滴入。100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

