

倍他司汀 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E5_80_8D_E4_BB_96_E5_8F_B8_E6_c22_312365.htm 药品名称倍他司汀药物别名抗眩啖，培他啖，甲胺、乙吡啖，BETASERC 英文名称Betahistine 类别四周血管扩张药性状常用其二盐酸盐，为白色或类白色结晶或结晶性粉末；无臭，味微苦；易潮解。在水中极易溶解，在乙醇中微溶，在丙酮中几乎不溶。制剂片剂：每片4mg；5mg。注射液：每支2mg（2ml）；4mg（2ml）。分子式成分药理及应用为一种组胺类药物，具有扩张毛细血管的作用，作用较组胺持久，能增加脑血流量及内耳血流量，消除内耳性眩晕、耳鸣和耳闭感。又能抑制组胺的释放，产生抗过敏作用。临床用于内耳眩晕症，对脑动脉硬化、缺血性脑血管病、头部外伤或高血压所致竖立性眩晕、耳鸣等亦可用。用法用量每次服4~8mg，1日2~4次。或肌注1次2~4mg，1日2次。注重事项（1）偶有口干、胃部不适、心悸、皮肤瘙痒等。（2）消化性溃疡、支气管哮喘及嗜铬细胞瘤患者慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com