

甲溴贝那替秦 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022_E7_94_B2_E6_BA_B4_E8_B4_9D_E9_c22_312484.htm 药品名称甲溴贝那替秦药物别名溴甲乙胺痉平，服止宁，胃仙，溴化甲基胃复康，Ficilin，Spatomac 英文名称Benactyzine Methobromide 类别胃肠解痉药性状为白色鳞片状结晶，味苦。易溶于水和乙醇。熔点177～178℃。制剂片剂：每片10mg。药理及应用本品有解痉及抗胃酸分泌的作用，能减轻胃及十二指肠溃疡患者的症状，如胃痛、恶心、呕吐及消化不良，能抑制胃液分泌过多和胃运动过度而使胃肠功能趋于正常。适用于胃及十二指肠溃疡、胃痛、胆石绞痛、多汗症和胃酸过多症。用法用量每次10～20mg，每日3次，饭后服。剂量可按病情轻重调整，最大剂量每次30mg，儿童根据年龄酌减。为预防复发，在胃、十二指肠溃疡症状消失后，宜继续以小剂量给药2～3月。如胃酸过多，为预防溃疡发展，宜于睡前再给药1次。注意事项（1）有口干、排尿困难、瞳孔散大及便秘等不良反应，但为时很短。如副作用较重时，可减少剂量，以后再恢复剂量。（2）青光眼患者忌用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com