

卡巴克络 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E5_8D_A1_E5_B7_B4_E5_85_8B_E7_c22_312626.htm

药品名称卡巴克络 英文名称卡巴克络 Carbazochrome 类别促凝血药性状桔红色结晶性粉末或片状结晶，能溶于水。其13%溶液的pH为6.7~7.3。

制剂片剂：每片2.5mg；5mg。注射液：每支5mg（1ml）；10mg（2ml）。止血棉：由安络血、药用明胶、依地酸二铜、甲醛等经严密消毒后制成的海绵状物，止血效果较好，能被人体组织吸收，适用于战伤出血及各种外伤出血的急救，尤适用于不好缝合及结扎的脏器出血如肝、脾出血等，也可用作外科手术的止血剂。用时将本品切成所需的外形（大于伤面），覆盖于出血处，按压至少1分钟，俟血止后缠上绷带。

为防止本品染菌及吸湿，必须密封。分子式成分药理及应用能增强毛细血管对损伤的抵抗力，降低毛细血管的通透性，促进受损毛细血管端回缩而止血。主要用于毛细血管通透性增加所致的出血，如特发性紫癜、视网膜出血、慢性肺出血、胃肠出血、鼻衄、咯血、血尿、痔出血、子宫出血、脑溢血等。对大量出血和动脉出血疗效较差。用法用量口服，成人，每次2.5~5mg，1日3次。肌注，每次5~10mg。亦可静注。

注意事项（1）本品中含水杨酸，长期反复应用可产生水杨酸反应。（2）有癫痫史及精神病史者应慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com