

氯马斯汀 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/312/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B0\\_AF\\_E9\\_A9\\_AC\\_E6\\_96\\_AF\\_E6\\_c22\\_312689.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E6_B0_AF_E9_A9_AC_E6_96_AF_E6_c22_312689.htm) 药品名称氯马斯汀  
药物别名吡咯醇胺，克立马丁，Meclastin，Mecloprodin，TAVEGIL，TAVIST 英文名称Clemastine 类别抗组胺药性状  
常用其富马酸盐，为白色或类白色结晶性粉末；无臭，味微苦。在甲醇中微溶，在水或氯仿中极微溶解。制剂片剂：每片1.34mg。注射液：每支1.34mg。分子式成分药理及应用组胺H1受体拮抗剂，作用强大，较氯苯那敏强约10倍。服用30分钟后见效，1~6小时达作用最高峰，作用可维持12小时。其特点不仅是强效与长效，尚具有显著的止痒作用，而中枢抑制作用微弱，因而嗜睡副作用稍微且少见。适用于过敏性鼻炎、荨麻疹、湿疹及其他过敏性皮肤病，也可用于支气管哮喘。用法用量口服：每次1.34mg（富马酸氯马斯汀，以下同），1日2次，早晚各服1次。肌注：1日1.34~2.68mg。注重事项  
偶见轻度嗜睡、食欲不振、恶心、呕吐。用药期间不宜驾驶车辆、治理机器及高空作业等。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)