

氨甲苯酸〔典〕 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/312/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B0\\_A8\\_E7\\_94\\_B2\\_E8\\_8B\\_AF\\_E9\\_c22\\_312691.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E6_B0_A8_E7_94_B2_E8_8B_AF_E9_c22_312691.htm)

药品名称氨甲苯酸〔典〕 英文名称Aminomethylbenzoic Acid 类别中药性状日色或类白色鳞片状结晶或结晶性粉末；无臭，味微苦。在水中略溶，在沸水中溶解，在乙醇、氯仿、乙醚或苯中几乎不溶。为酸碱两性化合物，故在碱性或酸性溶液中均能溶解。制剂注射液：每支0.05g（5ml）；0.1g（10ml）。片剂：每片0.125g；0.25g。分子式成分药理及应用具有抗纤维蛋白溶解作用，其作用机制与氨己酸相同，但其作用较之强4~5倍。口服易吸收，生物利用度为70%。经肾排泄， $t_{1/2}$ 为60分钟。毒性较低，不易生成血栓。适用于纤维蛋白溶解过程亢进所致出血，如肺、肝、胰、前列腺、甲状腺、肾上腺等手术时的异常出血，妇产科和产后出血以及肺结核咯血或痰中带血、血尿、前列腺肥大出血、上消化道出血等，对一般慢性渗血效果较显著，但对癌症出血以及创伤出血无止血作用。此外，尚可用于链激酶或尿激酶过量引起的出血。用法用量静注，每次0.1~0.3g，用5%葡萄糖注射液或0.9%氯化钠注射液10~20ml稀释后缓慢注射，1日最大用量0.6g。儿童每次0.1g。口服，每次0.25~0.5g，1日3次。注意事项用量过大可促进血栓形成。对有血栓形成倾向或有血栓栓塞病史者禁用或慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)