

苯噻啶 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E8_8B_AF_E5_99_BB_E5_95_B6_c22_312698.htm 药品名称苯噻啶 药物别名pizotyline 英文名称pizotifen 类别抗组胺药 性状为类白色结晶性粉末；无臭，味苦。在氯仿中易溶，在乙醇中略溶，在水中不溶。制剂片剂：每片0.5mg。分子式成分药理及应用化学结构类似赛庚啶和阿米替林，具有抗5-羟色胺、抗组胺作用及较弱的抗胆碱作用。主要用于防治偏头痛，能减少、减轻甚至完全解除偏头痛的发作；对急慢性荨麻疹、皮肤划痕等症疗效较好。也可用于血管神经性水肿。毒性小，可长期服用。贮存密闭、避光贮存。用法用量口服，每次0.5~1mg，1日1~3次。第1~3日每晚服0.5mg，第4~6日每日中午及晚上各服0.5mg，第7天开始每日早、午、晚各服0.5mg，病情基本控制后可酌情递减剂量。有人每日口服0.5mg即可控制头痛，也有个别人需每日应用6mg者。一般连续服药半年后可暂停半月至1月以观察停药后的效果，且能避免药物在体内蓄积。如病情复发可继续应用。注重事项（1）本品可引起嗜睡、乏力、食欲增加、体重增长，偶可引起恶心、头晕、面红、肌肉痛等，一般常见于开始服药的1~2周内，继续服药可逐渐减轻或消失。（2）长期服药过程中应适当注重血象变化。（3）闭角型青光眼患者、前列腺肥大尿闭患者及孕妇忌用。（4）不宜与单胺氧化酶抑制剂伍用。（5）机动车驾驶员及高空作业者应遵医嘱慎用。以免发生意外事故。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com