

特非那定 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/312/2021\\_2022\\_E7\\_89\\_B9\\_E9\\_9D\\_9E\\_E9\\_82\\_A3\\_E5\\_c22\\_312710.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022_E7_89_B9_E9_9D_9E_E9_82_A3_E5_c22_312710.htm) 药品名称特非那定药物别名丁苯哌丁醇，叔哌丁醇，司立泰，敏迪，得敏功，TELDAN，NEBRACIN，SELDANE，TAMAGON 英文名称Terfenadine 类别抗组胺药制剂片剂：每片60mg。混悬剂；30mg (5ml)。分子式成分药理及应用本品选择性地阻断组胺H1受体。具有良好的抗组胺作用。无镇静及抗毒蕈碱样胆碱作用。其作用起效较阿司咪唑快，持续时间比阿司咪唑短。本品口服后吸收迅速、良好。2小时后血药浓度达峰值。与血浆蛋白结合率为97%。大部分经肝代谢，主要代谢产物有二，一为羧酸衍生物，仍具抗组胺药理活性；二为吡啶-伯醇衍生物，无活性。其代谢物及少量原形药物由尿及粪便排出。t<sub>1/2</sub>为16～23小时。本品不易通过血脑屏障。本品主要用于过敏性鼻炎和荨麻疹，也可用于过敏性皮肤病和枯草热。用法用量口服。成人：60mg / 次，1日2次。儿童：6～12岁，30～60mg / 次，1日2次；3～5岁，15mg / 次，1日2次。均于饭后服。注意事项偶有头痛，轻度胃肠反应，大剂量可引起心律失常。肝功能低下者禁用。不宜与红霉素、酮康唑、依曲康唑同时服用。不宜与能引起心律失常的药物同用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)