

酚磺乙胺 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E9_85_9A_E7_A3_BA_E4_B9_99_E8_c22_312715.htm 药品名称酚磺乙胺

英文名称Etamsylate 类别促凝血药性状白色结晶或结晶性粉末；无臭，味苦；有引湿性，遇光易变质。在水中易溶，在乙醇中溶解，在丙酮中微溶，在氯仿或乙醚中不溶。熔点127~131。制剂注射液：每支0.25g（2ml）；0.5g（5ml）；1.0g（5ml）。片剂：每片0.25g分子式成分药理及应用能增加血液中血小板数量，增强其聚集性和粘附性，促使血小板释放凝血活性物质，缩短凝血时间，加速血块收缩。尚可增强毛细血管抵抗力，降低毛细血管通透性，减少血液渗出，止血作用迅速，静注后1小时作用达高峰，作用维持4~6小时。口服也易吸收。适用于预防和治疗外科手术出血过多，血小板减少性紫癜或过敏性紫癜以及其它原因引起的出血，如脑出血、胃肠道出血、泌尿道出血、眼底出血、齿龈出血、鼻衄等。可与其他类型止血药如氨甲苯酸、维生素K并用。用法用量（1）预防手术出血术前15~30分钟静注或肌注，1次0.25~0.5g，必要时2小时后再注射0.25g，1日0.5~1.5g。（2）治疗出血成人，口服，每次0.5~1g。儿童，每次10mg/kg，1日3次。肌注或静注，也可与5%葡萄糖溶液或生理盐水混合静滴，每次0.25~0.75g，1日2或3次。必要时可根据病情增加剂量。注重事项本品毒性低，但有报道静注时可发生休克。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com