

卤唑仑 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E5_8D_A4_E5_99_81_E5_94_91_E4_c22_312725.htm 药品名称卤唑仑药物别名Somelin 英文名称Haloxazolam 类别苯二氮卓类性状本品为白色结晶或结晶性粉末，易溶于冰醋酸、二氧六环，难溶于甲醇、无水乙醇，几乎不溶于水。熔点为179~184℃。

制剂片剂：4mg；10mg。颗粒剂：每g含10mg。分子式成分药理及应用本品具有较好的催眠作用，其作用强度相似于硝西泮，而比氟西泮强。其催眠特点为可缩短醒觉时间，延长慢波睡眠时间，引起的睡眠接近于自然正常睡眠。作用部位在大脑边缘系统及下丘脑，阻滞各种情绪刺激传向醒觉系统而诱发睡眠。并有抗焦虑作用。口服后迅速吸收，30分钟分布于全身组织，60分钟达峰浓度，2~3天几乎自体内全部消失。主要由肝脏代谢，肾脏排出。临床应用本品治疗神经障碍所致的失眠、焦虑或焦虑抑郁症。用法用量口服：5~10mg，睡前服。注重事项（1）本品毒副作用较少，但长期大量连续使用后忽然停药时，会出现戒断症状，故停药应逐渐减量。（2）其它不良反应有头重、头痛、眩晕、焦躁感、口干、恶心、呕吐、便秘、呼吸抑制、肌无力等，偶见ALT升高、黄疸、步态失调等。（3）禁用于闭角性青光眼、重症肌无力。原则上不用于肺源性心脏病、肺气肿、支气管哮喘及脑血管障碍等患者。年老体弱者、心脏病及肝肾功能不良患者、孕妇及哺乳期妇女慎用。（4）与吩噻嗪类、巴比妥类、MAOI同用或饮酒，均可增强本品作用。（5）服药次晨可能有困倦、注意力及反射运动能力降低，应避免驾驶汽车与操作机器。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。

详细请访问 www.100test.com