

盐酸美克洛嗪 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E7_BE_8E_E5_c22_312750.htm 药品名称盐酸美克洛嗪 英文名称Meclozine Hydrochloride 类别抗组胺药制剂片剂
：25mg。分子式成分化学名：1-〔（4-氯苯基）苯甲基〕-4-〔（3-甲苯基）甲基〕-哌嗪二盐酸盐。分子式
：C₂₅H₂₇ClN₂·2HCl。分子量：463.88。药理及应用本品为组胺受体的拮抗剂，可对抗组胺引起的降压效应、并对致死量组胺引起的动物死亡起保护作用。并有中枢抑制和局麻作用。抗晕动症和眩晕效应与其抗胆碱作用有关。药动学口服后1小时起效，T_{1/2}为6小时，用药一次可维持药效8～24小时。适应症皮肤粘膜过敏性疾病，亦可用于放疗及晕动症引起的恶心、呕吐。不良反应常见困倦，其他尚有视力模糊、乏力、口干等反应。相互作用（1）本品可使乙醇、中枢抑制药和抗胆碱药的作用加强。（2）本品可拮抗阿朴吗啡的催吐作用。用法用量口服，25mg/次，3次/日。预防晕动病：应提前1小时服药，每次25～50mg，每日1次。#093.过量可能引起精神错乱、抽搐、震颤、呼吸困难、低血压。如服用中毒量，可用生理盐水洗胃和导泻。抽搐时可静注地西洋控制。低血压者可使用血管收缩药对症治疗，其他包括给氧和静脉输液等支持疗法。注重事项妊娠B类。对本品过敏者禁用。（1）在下列情况下应慎用：膀胱颈狭窄、良性前列腺肥大、闭角型青光眼、幽门十二指肠狭窄等。（2）本品可抑制组胺引起的皮肤反应，在药物过敏性皮试前72小时应停用本品，以免出现假阴性反应结果。#093.大鼠超过人常用剂量25～50倍可见幼仔腭裂。经药物流行病学调查，未发现不良反应。医

生应用于孕妇时应权衡利弊。因本品可进入乳汁，哺乳期妇女不宜用。 #093. 新生儿、早产儿不宜用。 #093. 老年人对成人常规剂量较敏感，易发生低血压、精神错乱、滞呆和头晕，应酌情减量。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com