

加压素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E5_8A_A0_E5_8E_8B_E7_B4_A0_c22_312773.htm 药品名称加压素 药物别名必压生 Pitressin 英文名称Vasopressin 类别脑垂体激素及其有关药物制剂注射液：1ml:10u、1ml:20u。药动学主要经肝脏和肾脏排泄，T_{1/2}约10～20min，作用持续时间约2～8h，静脉注射给药后5%～15%以原形由尿排泄。适应症尿崩症、食管静脉曲张出血的治疗，也用于中枢性尿崩症、肾性尿崩症和精神性烦渴的鉴别诊断 不良反应荨麻疹、发热、支气管痉挛、皮肤发红、胸闷等过敏症状。大剂量可引起血压升高、心律失常、心绞痛或心肌梗死、四周血管收缩、腹部或胃部绞痛、恶心、呕吐、出汗增多、腹泻、暖气等。相互作用卡马西平、氯磺丙脲可增强本品的抗利尿作用，锂制剂、去甲肾上腺素可减弱本品的抗利尿作用。用法用量尿崩症，肌肉或皮下注射，成人5u～10u/次，2～3次/日，小儿2.5u～10u/次，3～4次/日。诊断试验，皮下一次注射5u。食管静脉曲张出血，静脉滴注，400u/次，滴速0.4u/min，滴注时间不超过12h为宜，出血停止后以0.2u/min的滴速再持续24h。注重事项妊娠B类，孕妇及对本品过敏者禁用，哮喘、癫痫、冠心病、心功能不全、偏头痛、高血压及肾功能损害者慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com