

氯美噻唑 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E6_B0_AF_E7_BE_8E_E5_99_BB_E5_c22_312780.htm 药品名称氯美噻唑药物别名噻唑乙二碳酸盐，Chlormethiazole，Hemlneurin 英文名称Clomethiazole 类别其他催眠药制剂片剂：500mg糖浆剂

：250mg(5ml)注射剂：8mg(1ml) 药理及应用具有镇静、催眠、抗惊厥作用。口服吸收迅速而完全，有首过效应。肝脏代谢，肾脏排出。血浆 $t_{1/2}$ 为7~8小时。适用于治疗精神焦虑性失眠或老年性失眠，亦可用于治疗酒精或药物成瘾的急性戒断症状。静注用为癫痫状态和子痫前期毒血症的催眠剂和抗惊厥剂用法用量口服：催眠：500mg。睡前服。镇静：每次250mg，每日3次。治疗酒精或药物成瘾戒断症状：每次750mg，6小时1次，共用2；然后每次500mg，6小时1次，共3日；再后每次250mg，6小时1次，共4日 静注：子痫前期毒血症：开始滴注0.8%溶液30~50ml，滴速为每分钟60滴，直到病人倦睡，然后滴速减至每分钟10~15滴。癫痫持续状态：滴注0.8%溶液40~100ml(5~10分钟以上)直到惊厥控制 注重事项常见不良反应有鼻内刺麻感、喷嚏和结膜刺激。大剂量可引起呼吸抑制，血压下降。长期服药有依赖性。本品与吩噻嗪类、丁酰苯类、巴比妥类、乙醇有相互作用，不宜合用 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com