

善宁 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/312/2021\\_2022\\_\\_E5\\_96\\_84\\_E5\\_AE\\_81\\_c22\\_312782.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E5_96_84_E5_AE_81_c22_312782.htm) 药品名称善宁药物别名奥曲肽,善得定注射液 英文名称Octreotide 类别脑垂体激素及其有关药物制剂注射针剂:0.1mg/支药动学皮下注射后吸收迅速而完全,给药后30min血浆浓度达峰值,T<sub>1/2</sub>约100min。静脉注射后消除呈双相性,T<sub>1/2</sub>分别为10min和90min。适应症肢端肥大症及胃肠胰内分泌肿瘤有关的症状,如具类癌综合征的类癌瘤血管活性肽(VIP)瘤、胰高糖素瘤等。亦用于胰腺疾病,如急性重型胰腺炎、胰损伤或手术后胰痿、预防胰腺手术后并发症、上消化道出血及胃肠道痿管等。不良反应主要是局部和胃肠道反应,并可发生肝或胆的功能失调,如局部疼痛、腹泻、脂肪痢、胆石形成等。相互作用可降低肠道对环孢素的吸收,而使西咪替丁的吸收延缓。用法用量皮下注射,肢端肥大症,开始0.05mg~0.1mg/次,2~3次/日,较适剂量为0.2mg~0.3mg/日,最大用量1.5mg/日,若本品治疗1月后仍无效,则应停药;胃肠胰内分泌肿瘤,开始0.05mg/次,1~2次/日,可逐渐提高剂量至0.2mg/次,3次/日,老年患者无需改变剂量;急性重型胰腺炎,0.1mg~0.2mg/次,3次/日,连用3~7日;胰损伤或手术后胰痿0.1mg/次,3次/日,连用7~14日;预防胰腺手术后并发症0.1mg/次,3次/日,连用5~7日;胃肠道痿管0.1mg/次,3次/日,连用10~14日;应激性及消化性溃疡出血,0.1mg/次,3次/日。肝硬变食管静脉曲张出血,静脉注射0.1mg后改为每2h静脉滴注0.05mg,连用24~48h。注重事项妊娠B类,对本品过敏者及孕妇禁用。在治疗前及用药后每隔6~12个月作肝胆超声检查。100Test 下载频道开

通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)