

生长抑素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E7_94_9F_E9_95_BF_E6_8A_91_E7_c22_312789.htm 药品名称生长抑素药物别名施他宁、思他宁 Stilamin 英文名称Somatostatin 类别脑垂体激素及其有关药物制剂粉针剂：0.25mg、3mg。药动学静脉注射后的血浆T_{1/2}约在1.1～3min之间，而肝脏病人T_{1/2}约1.2～4.8min，慢性肾衰病人的T_{1/2}约在2.6～4.9min。适应症严重急性食道静脉曲张出血、严重急性胃或十二指肠溃疡出血，胰、胆和肠瘘的辅助治疗，胰腺手术后并发症的预防和治疗，糖尿病酮症酸中毒的辅助治疗。不良反应可出现恶心、眩晕、脸红等症状。相互作用不与环己烯巴比妥、戊烯四唑等同时使用。用法用量静脉给药，临用前用生理盐水溶解，慢速冲击注射0.25mg/3～5min，或连续滴注0.25mg/h。在两次输液给药间隔大于3～5min时，应采取重新静脉注射0.25mg本品的措施，以确保给药的连续性。注重事项妊娠期或哺乳期慎用，对本品过敏者禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com