

咪达唑仑 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E5_92_AA_E8_BE_BE_E5_94_91_E4_c22_312790.htm 药品名称咪达唑仑药

物别名速眠安，DORMICUM 英文名称Midazolam 类别苯二氮卓类制剂片剂：每片15mg。注射剂：每支5mg（1ml）

；15mg（3ml）。分子式成分药理及应用本品具有典型的苯二氮卓类药理活性，可产生抗焦虑、镇静、催眠、抗惊厥及肌肉松弛作用。肌注或静注后，可产生短暂的顺行性记忆缺失，使患者不能回忆起在药物高峰期间所发生的事情。本品作用特点为起效快而持续时间短。服药后可缩短入睡时间（一般自服药到入睡只需20分钟），延长总睡眠时间，而对快波睡眠（REM）无影响，次晨醒后，患者可感到精力充沛、轻松愉快。无耐药性和戒断症状或反跳。毒性小，安全范围大。本品口服与肌注均吸收迅速而完全，可分布于全身，经肝脏代谢或与葡萄糖醛酸结合而失活，最后自肾脏排出。血浆浓度可分为两个时相，分布时相 $t_{1/2}$ 为10分钟，消除时相 $t_{1/2}$ 为1.5~2.5小时。长期用药无蓄积作用，药动学数据及代谢保持不变，肝功能不良者及老年人对本药药动学参数无影响。本品适用于治疗失眠症，亦可用于外科手术或诊断检查时作诱导睡眠用。用法用量口服：治疗失眠症，每次15mg，睡前服。肌注：术前20~30分钟注射，成人一般为10~15mg（每公斤体重0.10~0.15mg）。可单用亦可与镇痛药合用。儿童剂量可稍高，每公斤体重0.15~0.2mg。作儿童诱导麻醉时，用本品5~10mg（每公斤体重0.15~0.2mg）与氯胺酮50~100mg（每公斤体重8mg）合用。静注：术前预备，术前5~10分钟注射2.5~5mg（每公斤体重0.05~0.1mg），可单用或与抗胆碱

药合用。用于诱导麻醉，成人为10~15mg（每公斤体重0.15~0.2mg），儿童为每公斤体重0.2mg。用于维持麻醉，小剂量静注，剂量和时间间隔视病人个体差异而定。注重事项（1）不良反应少见，极少数病人可出现短时间的呼吸功能影响，多半由于剂量过高或静注过快所致，因此静注时速度勿过快。（2）注射用药，老年人或循环系统疾病患者慎用。用药后3小时内留院观察。用药12小时内不得驾车或操作机器。（3）妊娠初期3个月内的孕妇、重症肌无力患者、对苯二氮过敏者禁用。（4）口服不适于精神分裂症或严重抑郁症患者的失眠。器质性脑损伤、严重呼吸功能不全者慎用。服药4~6小时内不得驾车或操作机器。（5）可增强中枢抑制药的作用，与酒精合用也可增强作用，故用本品后12小时内不得饮用含酒精饮料。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com