

达肝素钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/312/2021\\_2022\\_\\_E8\\_BE\\_BE\\_E8\\_82\\_9D\\_E7\\_B4\\_A0\\_E9\\_c22\\_312799.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E8_BE_BE_E8_82_9D_E7_B4_A0_E9_c22_312799.htm) 药品名称达肝素钠药物别名低分子肝素钠，法安明 Low Molecular Heparin Sodium 英文名称Dalteparin Sodium 类别抗凝血药制剂注射液：0.2ml：2500IU、0.2ml：5000IU、1ml：10000IU。药动学皮下注射生物利用度约90%，T<sub>1/2</sub>约3～4h，静脉注射T<sub>1/2</sub>约2h，T<sub>1/2</sub>在30IU～120IU/kg范围内与剂量成正比，本品主要经肾脏排泄。适应症深部静脉血栓及肺血栓，也用于预防血液透析时血凝块形成、不稳定型心绞痛等。不良反应大剂量易致出血。常见皮下血肿，偶见血小板减少、皮肤坏死，一过性转氨酶升高，罕见发生变态反应。相互作用香豆素类药、非甾体抗炎药、乙酰水杨酸以及右旋糖酐等可增强本品作用。维生素k等可拮抗本品的作用。用法用量皮下注射：深部静脉血栓，200IU/kg，1次/日，不宜超过18000IU；预防及高危手术血栓形成，术前1～2h，2500IU，术后每日2500IU；不稳定型心绞痛，一次120IU/kg，不宜超过10000IU，2次/日。注重事项对本品和肝素类制剂过敏者禁用。急性溃疡、脑出血、严重凝血功能异常、脓毒性心内膜炎等禁用。若出现用药过量，紧急时可用硫酸鱼精蛋白解救，硫酸鱼精蛋白1mg可中和本品100IU。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)