

去纤酶 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E5_8E_BB_E7_BA_A4_E9_85_B6_c22_312814.htm 药品名称去纤酶 英文名称

Defibrinogenase 类别抗凝血药制剂注射液：20NIH凝血酶单位

（2ml）。药理及应用具有纤维蛋白溶解活性、能使血浆纤维

蛋白原和纤维蛋白溶解，故能溶解血栓。此外，还能降低

血液粘度，延长凝血酶原时间和凝血时间，但对其他凝血因

子和血小板数量无明显影响。用于治疗血栓栓塞性疾病，如

脑血栓形成、脑栓塞、四肢动静脉血栓形成、视网膜静脉栓

塞等，对冠心病、心绞痛、心肌梗死也有一定疗效，能使心

绞痛症状缓解和消失。应用1~3日后，血浆纤维蛋白原减少

，优球蛋白溶解试验时间缩短，全血粘度时间、凝血酶原时

间和凝血时间延长，停用后约3~12日恢复正常。本品对出血

时间无影响。贮存需在5℃以下低温保存用法用量（1）皮试

：将去纤酶注射液0.1ml用0.9%氯化钠注射液稀释至1ml，皮

内注射0.1ml，15分钟后观察，注射局部丘疹直径不超过1cm

，伪足在3个以下者为阴性。皮试阴性者方可用药。（2）静

滴：每次0.25~1NIH凝血酶单位/kg，加于250~500ml0.9%

氯化钠注射液或5%葡萄糖盐水中，静滴4小时，每4~7日1次

，3~4次为1疗程。注重事项（1）少数人有头晕、乏力、齿

龈出血、皮下出血点，瘀斑及荨麻疹等，多在24~48小时出

现，3~5日内自行消失。（2）用药期间须注重出血倾向。有

出血性病灶和凝血机能低下者忌用。过敏体质者慎用。（3

）用药后5~10日内，应少活动，以防意外创伤。100Test下

载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com