

蚓激酶 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E8_9A_93_E6_BF_80_E9_85_B6_c22_312834.htm 药品名称蚓激酶 英文名称Lumbrukinase 类别抗凝血药制剂注射液：20NIH凝血酶单位（2ml）。药理及应用经动物试验表明本品具有溶解家兔肺动脉血栓及大鼠下腔静脉血栓的作用，它可使家兔优球蛋白溶解时间明显缩短。经临床试验表明本品可降低纤维蛋白原含量、缩短优球蛋白溶解时间、降低全血粘度及血浆粘度、t-PA活性增加。纤维蛋白溶酶原激活物抑制物活性降低、纤维蛋白降解产物增加等。用于缺血性脑血管病中纤维蛋白原增高及血小板聚集率增高的患者。贮存需在5℃以下低温保存。用法用量口服：1次两粒，1日3次，饭前半小时服用。3~4周为一疗程，也可连续服用。注重事项本品不良反应较少，可出现皮肤瘙痒、皮疹、恶心、腹泻等。有出血倾向的患者慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com