

多潘立酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E5_A4_9A_E6_BD_98_E7_AB_8B_E9_c22_312943.htm 药品名称多潘立酮
药物别名哌双咪酮，吗丁林，胃得灵，MOTILIUM 英文名称 Domperidone 类别止吐药、催吐药及胃肠推动药制剂片剂：每片10mg。栓剂：每个60mg。注射液：每支10mg（2ml）。滴剂：10mg / ml。混悬液：1mg / ml。分子式成分药理及应用本品为一作用较强的多巴胺受体拮抗剂，具有外周阻滞作用，不透过血脑屏障。静注本品5mg后，胃排空速率加快，并能消除阿朴吗啡引起的胃排空缓慢。胃镜检查表明，本品可使幽门舒张期直径增大，而不影响胃运动和分泌功能。本品易吸收，口服、肌注、静注或直肠给药均可。口服或直肠给药吸收迅速，t_{max}分别为15~30分钟和1小时，以胃肠局部药物浓度最高。其代谢主要在肝脏，以无活性的代谢产物随胆汁排出。半衰期约7~8小时。本品对偏头痛、痛经、颅外伤及颅内病灶、放射活疗以及左旋多巴、非甾体抗炎药等引起的恶心、呕吐均有效；对老年因各种器质性或功能性胃肠道障碍引起的恶心、呕吐亦有效。但对于术后或由于麻醉或化疗引起的呕吐无效。也用于慢性胃炎、慢性萎缩性胃炎、胆汁反流性胃炎、反流性食管炎；腹胀、上腹疼痛、恶心、嗝气、厌食等消化不良症。用法用量（1）肌注：每次10mg，必要时可重复给药。（2）口服：每次10~20mg，每日3次，饭前服。直肠给药：每次60mg，每日2~3次。注重事项（1）本品不良反应较少，主要有惊厥、肌肉震颤、流涎、平衡失调、眩晕等锥体外系症状，也有致月经失调的报道。（2）孕妇用药应权衡利弊，谨慎使用。（3）抗胆碱药可能拮

抗本品的作用。（4）婴儿由于血脑屏障功能未发育完全，可能引起神经方面的副作用。（5）栓剂最好在直肠空时插入。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com