

东菱精纯抗栓酶 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E4_B8_9C_E8_8F_B1_E7_B2_BE_E7_c22_312950.htm 药品名称东菱精纯抗栓酶 英文名称defibrin 类别抗凝血药制剂为注射液，每支10bu（1ml）及5bu（0.5ml）。宜低温（5℃以下，但避免冻结）保存。药理及应用本品的作用是分解纤维蛋白原，抑制血栓形成；诱发组织型纤维蛋白溶解酶原激活剂（t-pa）的释放，减弱纤维蛋白溶解酶原激活剂的抑制因子（pai）的活性，促使纤维蛋白溶解；增加血液流动性，防止血栓形成；降低血管阻力。加快血液流速，改善微循环。用于缺血性脑血管疾病，突发性耳聋，慢性动脉闭塞症（闭塞性血栓性脉管炎、闭塞性动脉硬化症等。）用法用量静脉滴注：成人首次10巴曲酶单位（bu），以后隔日1次，5bu，使用前用100ml以上的生理盐水稀释，静滴：1小时以上。通常疗程为1周，必要时可增至3~6周。注重事项（1）本品可引起轻度不良反应。如注射部位出血，创面出血，头痛、头晕、头重感，氨基转移酶增高。（2）有出血史或出血倾向、正在使用抗凝药或抗血小板药的患者，严重肝、肾功能不全、对本药过敏者禁用。（3）用药前及用药期间宜检查纤维蛋白原及血小板聚集情况，并注重临床症状。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com