

甲喹酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/312/2021_2022__E7_94_B2_E5_96_B9_E9_85_AE_c22_312960.htm 药品名称甲喹酮药物别名安眠酮，海米那，眠可欣，HYMINAL 英文名称Methaqualone 类别其他催眠药性状白色结晶性粉末，无臭，有苦味。不溶于水，溶于乙醇。制剂片剂：每片0.1g；0.2g。分子式成分药理及应用催眠作用出现快而持续长，一般用药后10～30分钟内起效，可持续6～8小时。用于神经衰弱、失眠、麻醉前给药。用法用量镇静：每次0.1g，1日3次。催眠：0.1～0.2g，睡前半小时服用。小儿酌减。注重事项（1）偶有轻度不适，如头晕、思睡等。少数患者出现皮疹、口舌或肢体麻木。个别患者有心悸、恶心、呕吐及全身无力等反应。（2）连续应用较大剂量数周，可产生耐受性及依赖性，故不可滥用。有用至8～20g致死者。（3）本品主要在肝脏代谢，肝功能不良者慎用。（4）服药一般不宜超过3个月。（5）动物实验表明有致畸作用，孕妇忌用。（6）有精神病史及躯体有剧痛者不宜用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com